


Epidemiologia dell'infezione da HIV in Italia

Barbara Suligoj, MD


Direttore - Centro Operativo AIDS

Istituto Superiore di Sanità, Roma


L'incidenza delle nuove diagnosi HIV ritorna ai valori pre-Covid




Le incidenze più elevate di nuove diagnosi HIV al centro




A Roma e Milano il numero maggiore di casi nel 2023




Aumenta l'età mediana alla diagnosi di HIV




Quasi il 90% dei casi attribuibili a trasmissione per via sessuale




Più della metà sono late presenters, molti già in AIDS (2023)




In eterosessuali le % più alte di late presenters



Ogni giorno, 7 persone scoprono di essere HIV+




Ogni giorno, 7 persone scoprono di essere HIV+




Di queste, 4 sono in fase avanzata di malattia

L'aumento delle nuove diagnosi HIV è più evidente tra gli stranieri




ISMU: stranieri regolari e irregolari 6.108.000 nel 2018, 5.775.000 nel 2023.

Il test HIV viene eseguito principalmente perché sono presenti dei sintomi HIV-correlati (2023)




*proporzioni calcolate sul numero di diagnosi che riportano il motivo del test (circa 95%)

Circa 142.000 persone viventi con HIV in Italia





Continuum of Care, Italia, 2021



In rosso: % rispetto allo stadio precedente

In nero: % rispetto al totale delle PLWHIV

Considerazioni finali

- Circa **142.000** persone vivono con HIV in Italia
- L'andamento dell'incidenza è in **aumento**
- Il numero di nuove diagnosi nel 2023 è **tornato ai livelli 2019 pre-Covid**
- Un terzo delle nuove diagnosi è in **ultra-cinquantenni**
- L'incidenza tra **stranieri** è in aumento nonostante diminuisca il n. di stranieri in Italia
- Tra le persone con nuove diagnosi nel 2023, **un quarto è già in AIDS**
- **25.000** PLWHIV non sono in soppressione virale

Proposte conclusive

- Aumentare l'**informazione** su HIV (e altre IST)
- Destigmatizzare l'uso del **preservativo**
- Favorire l'accesso al **test HIV**:
 - Educare **MMG ed altri specialisti** ad offrire il test ove opportuno (presenza di sintomi, fattori di rischio)
 - Promuovere la **strategia opt-out** testing nei servizi ad alta prevalenza HIV (centri IST, SerD, centri TB, ecc.)
 - Implementare test HIV in **settings extra-sanitari** (check point, test rapidi, test in piazza, ecc.)



LAVORI PREPARATORI DEI PROGETTI DI LEGGE

Atto Camera: 218


D'ATTIS: "Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale" (218)

Piano sanitario nazionale HIV,
epatiti virali e infezioni
sessualmente trasmesse

Notiziario


dell'Istituto Superiore di Sanità

AGGIORNAMENTO DELLE NUOVE DIAGNOSI
DI INFEZIONE DA HIV
E DEI CASI DI AIDS IN ITALIA
AL 31 DICEMBRE 2023




Punti chiave - Dati in breve
Sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV
Sorveglianza dei casi di AIDS
Approfondimenti


Nel centro-nord gli aumenti maggiori di late presenters




Dopo 25 anni di decremento continuo, anche i casi di AIDS aumentano



La diminuzione delle infezioni HIV inizia negli anni '90



La presenza di sintomi è il motivo principale per l'esecuzione del test HIV



*proporzioni calcolate sul numero di diagnosi che riportano il motivo del test (circa 95%)